

Dijetetski proizvod - dodatak ishrani

Proizvod ne sadrži gluten

Liobif ampule

Regulator crevne flore

Probiotik sa najdužom tradicijom

Liobif je dodatak ishrani namenjen održavanju normalnog funkcionisanja crevne mikroflore i zdravlja čitavog organizma. U potpunosti izrađen domaćom tehnologijom, klinički ispitani i potvrđeni. Liobif ampule su pogodno za upotrebu za sve uzraste.

Liobif sadrži korisne bakterije iz roda *Lactobacillus* (*Lactobacillus rhamnosus*) čije dejstvo je značajno za:

- uspostavljanje i održavanje prirodne ravnoteže organa za varenje;
- poboljšanje apsorpcije i iskorišćavanje hranljivih materija;
- sintezu vitamina, eliminaciju toksina i stimulisanje imunog sistema;
- sprečavanje naseljavanja "štetnih" bakterija u gastrointestinalnom traktu kao deo zaštitne flore.

Sastav

Jedna ampula sadrži 10^8 - 10^{10} liofilizovanih živih bakterija *Lactobacillus rhamnosus* i pomoćne materije: proteine i ugljene hidrate sterilisanog mleka, saharozu i želatin.

Nutritivne vrednosti	100 g proizvoda	1 ampula
Energetska vrednost	375.3 kcal (1591.9 kJ)	0.5 kcal (2.1 kJ)
Proteina	11.3 g	15 mg
Ugljenih hidrata	76.9 g	100 mg
Masti	2.5 g	3 mg

Dejstvo Liobifa

- velikim brojem korisnih bakterija i njihovih produkata sprečava se rast patogenih bakterija u gastrointestinalnom traktu;
- utiče na smanjenje resorpcije holesterola i triglicerida;
- pokazuje pozitivno dejstvo u obnavljanju sluzokože usne duplje i iščezavanju afti;
- smanjuje pojavu alergije izazvane hranom jer crevna barijera sprečava prolaz alergena u krv.

Kada se uzima Liobif?

- kod dijareja koje su nastale usled dejstva infektivnih uzročnika i njihovih toksina;
- u stanjima gde postoji poremećaj crevne flore usled negativnog dejstva antibiotske terapije i drugih invazivnih terapija, kao i promena u ishrani (dijete, neredovna i nepravilna ishrana, stres i prekomerno uzimanje alkohola);
- kod povećanog holesterola i triglicerida u krvi;
- kod alergija (hronična urtikarija);
- kod stvaranja afti u ustima;
- u prevenciji crevnih infekcija: kod promenjenog režima ishrane u vreme putovanja, odlaska u regione sa povećanim rizikom od infektivnih bolesti (zagadenja vode i hrane).

Način upotrebe i doziranje

Liobif se uzima između obroka.

Ampula se otvara kao što je prikazano i objašnjeno na crtežima. U otvorenu ampulu se sipa voda da bi se sadržaj rastvorio. Rastvoren sadržaj ampule se prenese u kašiku i popije.



crtež 1

Levom rukom uhvatiti širi deo ampule, kako je prikazano (crtež 1), sa označenom tačkom na vratu ampule okrenutom prema sebi. Testericom zarezati ispod tačke.



crtež 2

Desnom rukom uhvatiti vrh ampule na mestu tačke i prelomiti u pravcu strelice (crtež 2).

Liobif se može koristiti u trudnoći i u periodu dojenja. Ampule se mogu davati odojčadi od prvog dana po rođenju.

Preporučena dnevna doza:

- prevremeno rođene bebe i bebe do 3 meseca starosti: 2 puta po pola ampule,
- od 3 do 24 meseca starosti: 1-2 ampule,
- od 2 do 3 godine starosti: 3 puta po 1 ampula,
- deca od tri godine starosti i odrasli: 3 puta po 1-2 ampule.

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti!

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva nisu poznata.

Napomene

Osobe preosetljive na sastojke proizvoda ne smeju da ga koriste. Liobif ampule ne sadrže gluten i aditive.

Ovaj proizvod ne predstavlja zamenu za raznovrsnu ishranu.

Interakcije sa lekovima

Lactobacillus rhamnosus je neosetljiv: na sve cefalosporine, eritromicin, gentamicin, ciprofloksacin, vankomicin, klindamicin, rifampicin, trimetoprim-sulfametoksazol, fusidinsku kiselinu, nitrofurantoin i metronidazol. Osetljiv je na dejstvo penicilinskih i tetraciklinskih preparata, pa ga treba davati tek po završetku terapije ovim antibioticima.

Rok upotrebe i način čuvanja

Rok upotrebe na temperaturi od +2°C do +8°C (u frižideru) je utisnut na kutiji. Liobif ampule mogu se čuvati i van frižidera, zaštićene od svetlosti. Na sobnoj temperaturi rok upotrebe Liobif ampula je 4 meseca. Napomena: Vraćanjem u frižider ne može se produžiti rok upotrebe proizvoda.

Čuvati izvan domašaja dece.

Pakovanje

Kutija sa 10 ampula.



torlak

Institut za virusologiju, vakcine i serume

Vojvode Stepe 458
Beograd, Srbija
www.torlakinstitut.com

tel: 011/397 66 74
fax: 011/247 18 38
office@torlakinstitut.com



torlak

Institut za virusologiju, vakcine i serume

Vojvode Stepe 458
Beograd, Srbija
www.torlakinstitut.com

tel: 011/397 66 74
fax: 011/247 18 38
office@torlakinstitut.com